



FICHA TÉCNICA TYSON 2E

- **PLAGUICIDA:** Insecticida concentrado emulsionable, a base de CLORPIRIFOS ETIL, que pertenece al grupo de los Organofosforados
- **SINÓNIMOS:** O,O-dietil O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) fosforotioato; O,O-dietil O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) éster de ácido fosforotioico; Dursban; Brodan; Eradex; Lorsban; Pyrinex
- **COMPOSICIÓN PORCENTUAL:** Clorpirifos etil: 0,0-Dietil O-(3, 5, 6-tricloro-2-piridinil) fosforotioato 26.24 % (Equivalente a 240 g de I.A./L); Solvente y emulsificantes, no más de 73.76 %.
- **REG:** RSCO-URB-INAC-115-353-009-26.24
- **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:** Líquido oleoso, color ámbar, olor característico a xilol y cloral; 1.2×10^{-2} mmHg a 20 °C; densidad relativa 1.100 g/ML; temperatura de inflamación 79.4 °C.
- **MODO DE ACCIÓN:** Insecticida de ingestión y de contacto, que al penetrar a las plagas, tanto rastreras como voladoras, actúa directamente sobre el sistema nervioso, causando una descoordinación muscular, de modo que las plagas pierden el control de sus movimientos, salen de sus madrigueras y mueren. La mezcla con dos sinergistas incrementan la efectividad (mayor mortalidad) y la rapidez (alto poder de derribo y desalojo) en el control de las plagas.
- **AUTORIZADO PARA SU USO:** Urbano para el control de cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, arañas, chapulines, pez plateado, garrapatas, escarabajos, termitas, tijerillas.
- Para tratamiento en supermercados, bodegas, sótanos, casas habitación, edificios, y lugares públicos en general como transportes, cines y expendios.



FICHA TÉCNICA TYSON 2E

PLAGAS QUE CONTROLA:

Nombre común	Nombre científico	Dosis de TYSON 2E	
		Baja infestación	Alta infestación
Cucaracha alemana	<i>Blatella germanica</i>		
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>		
Cucaracha asiática	<i>Blatta orientalis</i>		
Hormiga	<i>Atta spp</i>		
Hormiga roja de fuego	<i>Solenopsis invicta</i>		
Hormiga faraón	<i>Monomorium pharaonis</i>		
Chinche de cama	<i>Cimex lectularius</i>	10 – 20 ml en un	20 – 40 ml en un
Araña	<i>Licosa spp</i>	litro de agua,	litro de agua,
Pez de plata	<i>Lepisma saccharina</i>	keroseno o diesel	keroseno o diesel
Garrapata	<i>Boophilus microplus</i>		
Tijerilla	<i>Forficula auricularia</i>		
Pulga	<i>Pulex irritans</i>		
Chapulín	<i>Melanoplus sp</i>		
Escarabajo	<i>Hylotropes bajulus</i>		
Termita subterránea	<i>Reticulitermes lucifugus</i>		

- **FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Para mayores efectos y un mejor control sobre la plaga, aplicar en intervalos de 7 días hasta obtener un control total.
- **EQUIPO DE PROTECCIÓN:** Usar gorra y overol de algodón, guantes y botas de poli nitrilo, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, usar lentes de protección tipo químico.

- Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx