

"APLICACIÓN URBANA"

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD



Biothrine®

PM

deltametrina
Insecticida, polvo humectable,
piretroide

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:	% en peso
deltametrina: (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 25 g de i.a. / Kg).	2.50
Ingredientes inertes: Dispersante, anticongelante, antigrumoso, humectante, estabilizante y agente de carga.	97.50
TOTAL	100.00

RSCO-URB-INAC-119-386-002-03

Contenido neto: 20 g

	Nocivo en caso de ingestión	Nocivo por el contacto con la piel	Nocivo si se inhala
--	------------------------------------	---	----------------------------

No. de Lote:

AREA SIN BARNIZ

Fecha de fabricación: (año, mes, día)

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Titular del registro, importador y distribuidor: Bayer de México, S.A. de C.V.

Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F.

Tel: 01 (55) 5728 3000, Fax: 5262 9528, BayPremium 01 (55) 57 28 30 00, ext. 2740 y 2729.

Lada sin costo 01-800-229-37 37 Fax: 01 (55) 5262 9527 (www.saludambiental.com.mx)

Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatlilpa, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540, Tel.: 01 (55) 5728 3000.

"HECHO EN ESPAÑA" ENVASADO EN MÉXICO

© Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5

PRECAUCIÓN



"INSTRUCCIONES DE USO"
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Observaciones	Dosis (g/l de agua)	PLAGAS	
		Nombre común	Nombre científico
1 l. de mezcla inder. 33 ml de superficie 165 mm lineales en banda	10	Moscas	Musca domestica Fannia spp. Stomoxys calcitrans
		Mosquitos	Aedes spp. Anopheles spp. Culex spp.
		Palomillas	Sitotroga cerealealis Prodenia interpuncta Ephestia kuehneliae
		Hormigas	Lasius niger Solenopsis spp. Monomorium pharaonis
		Chinchies	Cimex lectularius
		Pulgas	Ctenocephalides canis Pulex irritans C. felis
		Cucarachas	Blattella germanica Periplaneta americana Blattella orientalis
		Arañas	Larocles spp. Lycosa spp.
		Arañes	Centropages spp. Vejovis spp.
		Para otras infestaciones aplicar a gragea, intervalos cortos	20 - 60

El efecto residual del producto es de 2 a 4 meses.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
• NO SE FORTALEZCA EN CASAS HABITACIONES.
• NO SE FORTALEZCA EN CASAS HABITACIONES.
• MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBAZAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.
• LAVASE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
• NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
• NO DESTAPAR LAS BOLSILLAS CON LA BOCA.
• NO DESTAPAR LAS BOLSILLAS SIN LA BOCA.
• LOS CONTENEDORES DE 18 LITROS NO DEBEN MANTENERSE PRODUCCIÓN.
• NO MEZCLE O PEGARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TRAZO DE LA MANO O OTRO MATERIAL APROPIADO.
• AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO LAVARSE Y PONGASE ROPA LIMPIA.
• NO SE INGERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y P.E.L.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRE ESTE ETIQUETA
Manténgase al paciente relajado y en reposo y llévese al médico. En caso de inhalación leve al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y manténgalo en reposo. En caso de contacto con los ojos enjuáguelos con abundante agua y jabón. En caso de ingestión con la piel lavar profusamente el área contaminada con agua y jabón. En caso de que el paciente presente síntomas de intoxicación, consulte al médico inmediatamente.

PRECAUCIONES AL AMBIENTE
• Durante el manejo del producto evite la contaminación de suelos, nos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavado o vertido en ellos. Evite que el empaque vacío y los residuos del producto contamine a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, su Reglamento o el Plan de Manejo de Embragos Vacíos de Plaguicidas Registrados ante la SEMARNAT.
• El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).
• En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recoger el producto que sea útil hasta donde sea posible y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.
• Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

INGENIEROS
En caso de intoxicación llamar al **SINTOX** 24 horas, 365 días del año, Teléfonos 01 (55) 6596-6699 y 01 (55) 5611-2634-LADA SIN COSTO 01800 0092800.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
• Durante el manejo del producto evite la contaminación de suelos, nos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavado o vertido en ellos. Evite que el empaque vacío y los residuos del producto contamine a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, su Reglamento o el Plan de Manejo de Embragos Vacíos de Plaguicidas Registrados ante la SEMARNAT.
• El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).
• En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recoger el producto que sea útil hasta donde sea posible y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.
• Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

Método para preparar y aplicar el producto.
Biothrine® PM debe mezclarse con agua según la dosis señalada, agítense bien hasta lograr una mezcla homogénea. Antes de una aplicación, agítense bien la mezcla para lograr mejores resultados. La aplicación deberá realizarse con cualquier aspersor convencional. Para cubrir áreas grandes y sitios elevados utilícese Biothrine® PM deberá aplicarse en lugares frecuentados por las plagas, en sus alrededores y áreas por las que transitan. Esta formulación está recomendada especialmente para tratamientos preventivos, acabados rústicos, superficies porosas y bardas, con alta absorción.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación.

Contraindicaciones: no aplicar con temperaturas superiores a los 35°C, ni en contra del viento.

GARANTÍA
Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Bayer de su localidad.

MX57423629C