

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (overol impermeable, guantes de PVC, goggles, mascarilla contra polvo o mascarilla completa con cartucho respiratorio). Mantenga el producto bien tapado en su empaque original. No use el producto en corrientes de agua.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE MANIPULANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

INHALACIÓN: Lleve al paciente a un lugar ventilado, manteniéndolo en reposo.
INGESTIÓN: Induzca el vómito. Consultar a doctor o comunicarse con un centro de atención para envenenamientos lo antes posible.
CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos con suficiente agua limpia.
No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.
6223-3

En caso de ingestión accidental por mascotas provóquese inmediatamente el vómito, lleve inmediatamente con el médico veterinario y muéstrela esta etiqueta.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Grupo químico del producto: Difenilaminas.

Antídoto y Tratamiento específico. Fastrac Blox no es un rodenticida anticoagulante, inducir al vómito y realizar lavado gástrico. Si el paciente presenta convulsiones suministrar antoconvulsivos como el diphenylhydantoin. En caso de edema cerebral suministrar diuréticos (mannitol) y corticosteroides (dexametasona).

Signos y síntomas de intoxicación: Adormecimiento, descoordinación, dolor de cabeza y confusión moderada. En casos agudos se puede presentar temblor general, convulsiones y dificultad al respirar.

"MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO. EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLA CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MÁS CERCANO".

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

"APLICACIÓN URBANA"



FASTRAC

BLOX™

Brometolina
Rodenticida / Bloques parafinados

INGREDIENTE ACTIVO % EN PESO

Brometolina: N-metil-2,4 -dinitro-N-(2,4,6-tribromofenil-6-(trifluorometil) bencenamina
NO MENOS DE: 0.01%

INGREDIENTES INERTES:

Atrayentes, colorante, portador y agente preventivo para la ingestión humana.
NO MAS DE: 99.99%
Total: 100.00%

No. de Registro: RSCO-URB-RODE-517-307-033-010

CONTENIDO NETO: 1.92 kg

120 Bloques de 15 g



PUEDEN SER NOCIVOS EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDEN SER NOCIVOS POR EL CONTACTO CON LA PIEL

Importado y distribuido por:
SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.

Amsterdam No. 143

Col. Hipódromo Condesa
06100 México, D.F.

Tels: (55) 5271 2990 / 5515 8893

www.univarmexico.com

Hecho En Estados Unidos De Norteamérica Por:



www.belllabs.com

Madison, WI 53704 U.S.A.

PRECAUCIÓN

"INSTRUCCIONES DE USO"

Utilice FASTRAC BLOX para el control de roedores como rata común o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*) y ratón doméstico (*Mus musculus*) de la siguiente forma:

PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	NO. DE BLOQUES PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
RATAS	LIGERA A MODERADA	2 a 8	Colóquese el producto indicado por punto de cebado o directo en la madriguera a cada 7 a 10 m.
RATA DE ALCANTARILLA RATA NEGRA	SEVERA	8 a 12	
EN MADRIGUERAS DE RATAS	Coloque de 1 a 2 FASTRAC BLOX dentro de cada madriguera.		
RATONES Ratón doméstico	LIGERA A SEVERA	1 a 4	Colóquese la cantidad de producto indicada por punto de cebado, directo en la madriguera de cada 2.5 a 4 m.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: Inmediata.

Métodos para preparar y aplicar el producto

Coloque FASTRAC BLOX donde observe señales de la presencia de roedores (tales como excrementos, manchas grasosas debidas al roer, pelos, huellas) así como la proximidad de sus madrigueras y caminos. Aplique este producto directamente en las entradas de cada madriguera y en sitios frecuentados por los roedores.

Mantenga constante la cantidad de FASTRAC BLOX hasta que cesen las señales de presencia de roedores. Para este producto la cantidad de cebo consumido es inferior a la que normalmente se requiere con rodenticidas anticoagulantes. A pesar de que una noche los roedores pueden consumir dosis letales, mantenga FASTRAC BLOX adicionalmente por una semana para garantizar la total eliminación de la plaga. Para prevenir la reinfestaciones establezca tratamientos de mantenimiento. Si ocurre una reinfestación repita el tratamiento. Cuando ya no haya actividad de roedores recupere los restos de cebo y destrúyalos, junto los roedores muertos y quémelos.

Frecuencia de aplicación: Repetir la aplicación en caso de reinfestación.

CONTRAINDICACIONES

FASTRAC BLOX es un cebo de aplicación directa. Manéjese los cebos con guantes. No se deben mezclar con insecticidas o ningún otro producto, para evitar el rechazo del cebo por los roedores. Evite manipular el producto con el fin de impedir que éste sea rechazado por los roedores.

"GARANTÍA"

SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con éste producto se obtengan.

032812/03-11



0 30835 40030 10

Product Code: 65930

Lote No.:

Fecha De Fabricación:

Fecha De Caducidad:

