

FICHA TECNICA

“APLICACIÓN URBANA”
Sorex[®] Bloques
difenacoum

Rodenticida / Bloques parafinados / Cumarinas

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Difenacoum: 3-[3-(1,1´Bifenil)-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenil]-4-hidroxi-2h-1-bezopiran-2-ona..... (Equivalente 0.05 gr.de i.a./kg)	0.005 %
INGREDIENTES INERTES:	99.995 %
TOTAL	100.00 %

REG.RSCO-URB-RODE-515-307-033-0.005

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MEXICO POR:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710 MÉXICO, D.F.
TEL: (55) 5325-2600

HECHO EN INGLATERRA

INSTRUCCIONES DE USO

Sorex[®] Bloques es un rodenticida anticoagulante, activo contra todas las especies de roedores urbanos como son *Rattus norvegicus*, *R. Rattus* y *Mus musculus* que causan daño en áreas urbanas, domésticas, jardines, áreas industriales, restaurantes, hospitales, y plantas procesadoras de alimentos. Es activo contra especies de roedores que presentan resistencia a otros anticoagulantes.

Método para preparar y aplicar el producto.

- Limpiar el área infectada lo mejor posible.
- Retirar todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores.
- Mantener los bloques protegidos de la humedad y la intemperie
- Revisar semanalmente los puntos de cebado y rellenarlos cuando sea necesario
- Reemplazar completamente todo cebo que se haya contaminado o dañado (moho)
- Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo.
- Conforme aparezca los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de los alimentos y de las fuentes de agua.
- Mantenga algunos puntos de cebado permanentes para evitar reinfestaciones.

Sorex[®] Bloques no causa recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado en el área a tratar.

- Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, dependiendo del estado físico y edad del roedor.
- Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es necesario.
- El número y tamaño de los puntos de cebo a usar dependerá de la severidad de la infestación.
- Se recomienda el uso de **Sorex[®] Bloques** en áreas exteriores. Proteger de la humedad a estaciones cebaderas resistentes (ROGUARD) a la intemperie, que requiera llave especial para su apertura.
- Se recomienda el uso de **Sorex[®] Bloques** en interiores, siempre y cuando lo amerite la infestación; el producto deberá colocarse después de terminadas las operaciones de las instalaciones y se deberá recuperar el cebo antes de iniciar operaciones.

PARA USO EN AREAS INTERIORES

Plaga	Infestación alta	Infestación baja
Rata	5 Bloques (20 g c/u) cada 5 m.	3 bloques cada 5-10 m.
Ratón	1 Bloque cada 1-2 m.	1 Bloque cada 3 m.

Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras y/o en lugares donde no sean molestadas (dentro de estaciones cebaderas ROGUARD). Los ratones se alimentan esporádicamente y les gusta nuevos objetos y lugares, por lo que es recomendable mover los cebaderos ocasionalmente. Se debe evitar el acceso de animales domésticos.